

Инструкции для пациента: использование детского мочеприемника Patient Instructions for Pediatric Urine Bags (Russian)

Если ребенок слишком мал, чтобы собрать образец мочи, можно воспользоваться детским мочеприемником с фиксацией при помощи клейкого слоя. Ниже указано, как надеть и снять мочеприемник, а также как обращаться с образцом мочи, собранным у Вашего младенца или маленького ребенка.

До начала процедуры

- Участок кожи, к которому будет крепиться мочеприемник, должен быть чистым и сухим. Рекомендуется промыть его водой с мягким мылом.
- Не обрабатывайте этот участок маслами, детскими присыпками и лосьонами, поскольку они могут остаться на коже и препятствовать закреплению на ней мочеприемника.

Помойте задействованную в процедуре область

1. Снимите с младенца подгузник и раздвиньте ножки, чтобы вымыть промежность.
2. Если Ваш ребенок — девочка: всегда вытирайте промежность движением спереди назад. Сначала протрите одну сторону мочеиспускательного отверстия, затем другую сторону, а затем область ниже центра. Выбросьте использованную салфетку и дайте данной области подсохнуть на воздухе.
3. Если Ваш ребенок — мальчик: промойте головку пениса. Если у Вашего ребенка есть крайняя плоть, оттяните ее и очистите головку пениса. Обязательно очистите мочеиспускательное отверстие. Выбросьте использованные салфетки и дайте данной области подсохнуть на воздухе.

Прикрепите мочеприемник

1. Сожмите центральную часть белой бумажной подложки мочеприемника, чтобы получилась складка. Снимите бумажный слой, чтобы открыть клейкую поверхность вокруг отверстия в мешке.
2. Прикрепите мочеприемник к телу ребенка следующим образом.
 - a. Если Ваш ребенок — девочка: разместите нижнюю (сложенную) часть клейкой поверхности на коже между анусом и отверстием влагалища. Мочеприемник должен смотреть вниз, в сторону ножек. Прикрепите мочеприемник, плотно прижимая его клейкую поверхность по направлению снизу вверх к коже вокруг влагалища.
 - b. Если Ваш ребенок — мальчик: аккуратно поместите пенис в мочеприемник. Разместите нижнюю (сложенную) часть клейкой поверхности на коже между анусом и мошонкой. Мочеприемник должен смотреть вниз, в сторону ножек. Прикрепите мочеприемник, плотно прижимая его клейкую поверхность по направлению снизу вверх к коже вокруг мошонки.

Инструкции для пациента: использование детского мочеприемника Patient Instructions for Pediatric Urine Bags (Russian)

Сбор образца мочи

1. Наденьте поверх мочеприемника подгузник. Убедитесь в том, что подгузник не тянет мочеприемник, иначе он может отклеиться.
2. После того, как ребенок помочился в мочеприемник, медленно отклейте его, чтобы не расплескать мочу. Держите мочеприемник в вертикальном положении, пока не перельете мочу в чистый контейнер, предоставленный лабораторией. Перелейте содержимое мочеприемника в стерильный контейнер для мочи и плотно закройте крышку, чтобы не пролить образец. Не кладите мочеприемник в контейнер и не везите его в лабораторию.
3. Наклейте на контейнер этикетку со следующей информацией:
 - a. имя и фамилия ребенка;
 - b. дата рождения;
 - c. дата и время сбора образца мочи; и
 - d. фамилия и имя врача, назначившего анализ.
4. Образцы мочи, в которых присутствуют частицы кала, для обследования не принимаются. Вам придется собрать новый образец мочи. Если после мочеиспускания в подгузнике младенца обнаружен кал, высока вероятность его попадания в образец мочи. В этом случае следует выбросить полученный образец мочи и прикрепить новый, чистый мочеприемник, чтобы получить другой образец.

Удаление клейкого слоя

- Не следует смазывать чувствительную кожу младенца средствами для удаления клейкого слоя. Если у Вас есть вопросы о том, как удалить клейкий слой, посоветуйтесь с Вашим врачом.

После сбора образца мочи его следует в кратчайшие сроки передать в лабораторию. Если Вы не можете передать образец мочи в лабораторию в течение 1–2 часов, его следует поместить в холодильник. Образцы мочи, которые провели в холодильнике более 24 часов, нельзя использовать для бактериального посева, и лаборатория их не примет.